© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

planulato-rotundatus et nullo modo ventriosus, basi distincte cuneatus. Apert. pro latitudine altissima, rotundato-triangularis, basi in tenuitatem desinens, faucibus fusco-purpureis, sinulo alto, subretracto; perist. continuum, satis solutum, late expansum, reflexum, albolabiatum. Lamella supera valida, marginalis, verticalis, cum spirali compressiore et modice humiliore continua; infera satis magna, e basi subcallosa oblique ascendens, media parte leviter concava, in faucibus lamellae superae parallela spiraliter recedens; subcolumellaris occulta. Principalis brevis, suturae parallela, ultra lunellam parum validam, dorso-lateralem, semilunarem non producta. — Alt. 20, lat. $3\,^{3}/_{4}$; alt. apert. 5, lat. $3\,^{1}/_{2}$ mm. (Spec. unicum.)

Species persingularis e grege Claus. Adamsianae P. (= chacaensis Lubom.), statura multo majore, apice turrito-producto, apertura distincte triangulari, lamella infera oblique ascendente nec subtransversa a specie Pfeifferiana diversa.

Literaturbericht.

Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 19—21. — Offenbach 1880.

p. 96. *Boettger, Dr. O.*, Aufzählung der von Herrn Dr. J. von Bedriaga im Frühjahr 1880 auf den Cycladen, in Morea und in Rumelien gesammelten Landschnecken.

p. 100. *Boettger, Dr. O.*, Aufzählung der von Herrn Edm. Reitter in Wien im Frühjahr 1880 in dem westlichen Montenegro, in Süd-Dalmatien und Süd-Croatien gesammelten Mollusken. — Neu Vitrina Reitteri, Hyalina Reitteri und Bul. Reitteri.

Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. VII. Heft 4.

p. 297. *Bergh, Dr. R.*, die Doriopsen des Mittelmeers. (Mit Taf. 10 c 11.)

p. 329. *Löbbecke und Kobelt*, Museum Löbbeckeanum. II. (Mit Taf. 7 c 8.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 338. *Weinland, Dr. D. F.*, zur Molluskenfauna von Haiti. (Mit Taf. I2.)

p. 379. *Boettger, Dr. O.*, Diagnoses Molluscorum novorum ab ill. Hans Leder in regione caspia Talysch dicta lectorum.

Hesse, P., zur Kenntniss der Molluskenfauna Westfalens. — In Jahresbericht der zoologischen Section für Westfalen und Lippe für 1879—80. p. 66 73.

Neu für Westfalen sind Hyalina Draparnaldi, subterranea, Hel bidens, Pupa minutissima, angustior; der Aufsatz entsält ausserdem eine Aufzählung der im Wesergeniste beobachteten Conchylien.

Lessona, Mario, Molluschi viventi del Piemonte. — In Atti della Reale Academia dei Lincei. 1870—80.

Als neu beschrieben werden Clausilia pollonerae, zunächst mit diodon verwandt, Cl. Calderini, Genei, Gonostoma cameroni, Fruticicola globus, segusina, Campylaea Strobeli, Physa Stabilei, Pomatias Veranyi, Sphaerium padanum.

Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Zweiter Band, zweites Heft.

p. 150. *Vigelius W. J.*. Untersuchungen an Thysanoteuthis rhombus Troschel, ein Beitrag zur Anatomie der Cephalopoden.

p. 222. *Bergh, Dr. R.*, über die Gattung Peltodoris (Taf. 11). —

Koch, Dr. C., Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den thüringischen Staaten. Blatt Eltville.

Enthält auch paläontologische Bemerkungen, besonders eine Aufzählung der Fauna des Blättersandsteins, der Cyrenenmergel, des Löss und des Sandlöss, sowie der Alluvialschichten.

Hubrecht, Dr. A. A. W., Proneomenia Sluiteri n. gen. et spec., eine neue archaische Molluskenform aus dem Eismeer. — Im Zool. Anzeiger p. 589. (Vorläufige Mittheilung.)

Mittheilungen und Anfragen.

Der Unterzeichnete hat eine reiche Sendung neuseeländischer Conchylien erhalten und ist in der Lage zahlreiche Doubletten in Tausch abzugeben.

Schwanheim a. M. Dr. W. Kobelt.